



ที่ ขก ๘๘๐๐๕/ว.๑๖๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขง
อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๑๐

๘ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความร่วมมือร้านค้าค้าขายเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี
เรียน ผู้ประกอบการร้านค้า/สถานบริการในพื้นที่ตำบลหนองแขง

ด้วย พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๙ ได้กำหนดห้ามมิให้ผู้ใด
ขายเครื่องตี้มแอลกอฮอล์แก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ และผู้ที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้ หาก
ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นั้น

เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลดปัญหาการเข้าถึงเครื่องตี้ม
แอลกอฮอล์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขง จึงขอความร่วมมือท่านผู้ประกอบการ
ดำเนินการดังนี้

๑. งดจำหน่ายเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ทุกชนิดให้แก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์
๒. ตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ซื้อทุกครั้ง หากไม่แน่ใจในอายุ
๓. ติดป้ายประกาศหน้าร้านอย่างชัดเจนว่า "ห้ามจำหน่ายเครื่องตี้มแอลกอฮอล์แก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี"
๔. จำหน่ายในเวลาที่ถูกกฎหมายกำหนดเท่านั้น (๑๑.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. และ ๑๗.๐๐ - ๒๔.๐๐ น.)


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมืออย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ


(นายพงษ์ศิริ โทณะพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขง
โทร.๐๔๓-๐๐๐๔๑๑



อันตราย



เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี

เป็นการละเมิด พ.ร.บ.แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ตามมาตรา 29 มีโทษตามมาตรา 40
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

AUTHORIZED PERSONNEL ONLY


โทษ และ พิษภัย

ของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพ

เมื่อแอลกอฮอล์เข้าสู่ร่างกาย



• แอลกอฮอล์ประมาณ ร้อยละ 10 - 20 จะถูกดูดซึมจาก กระเพาะอาหาร



• แอลกอฮอล์ที่เหลือ ร้อยละ 80 - 90 ถูกดูดซึมผ่านลำไส้เล็ก และเข้าสู่กระแสเลือด



• ซึ่งจะสามารถตรวจพบ แอลกอฮอล์ในเลือดได้ ภายในเวลาเพียง 5 นาที หลังจากเริ่มดื่ม

• ก่อนจะส่งต่อไปยังเซลล์ เนื้อเยื่อ ของเหลว ทุกแห่งในร่างกาย และอวัยวะต่างๆ และส่งผลต่ออวัยวะต่างๆ ที่ในร่างกาย

ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด



จะขึ้นกับอัตราการดูดซึมและ ปริมาณแอลกอฮอล์ที่ดื่มเข้าไป โดยทั่วไประดับแอลกอฮอล์ในเลือด จะขึ้นสู่ระดับสูงสุดในเวลา 30 - 90 นาที ขึ้นกับอายุ เพศ และลักษณะ การพันธุกรรมของผู้ดื่ม

เมื่อดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณเท่ากัน พบว่า



คนอ้วนเตี้ย จะมีระดับ แอลกอฮอล์ในเลือด สูงกว่า คนผอมสูง

เนื่องจากคนอ้วน มีไขมันมากกว่า คนผอม แอลกอฮอล์จึงคงอยู่ในเนื้อเยื่อไขมันมากกว่า



ผู้หญิง มาเร็วกว่าผู้ชาย

เนื่องจากผู้หญิง มีปริมาณไขมันมากกว่า แต่มีพื้นที่น้ำ น้อยกว่าผู้ชาย

การดื่มแอลกอฮอล์ ในขณะท้องว่าง ทำให้เมาเร็ว



สมองและระบบประสาท

- กลดการทำงานของระบบประสาทส่วนกลาง
- หากดื่มยาวนาน จะทำให้กลีบสมองขยายตัว เกิดอาการที่เรียกว่า สมองบวม

ผิวหนังและหลอดเลือด

- หลอดเลือดจะขยายตัว ทำให้หน้าแดง ตัวแดง
- บางคนอาจมีอาการเส้นเลือดหดตัว ทำให้หน้าซีด ซึ่งบ่งชี้อันตรายต่อชีวิตมากกว่า

ตับ

- ตับเป็นอวัยวะที่ได้รับพิษจากแอลกอฮอล์มากที่สุด
- เซลล์ตับที่ถูกทำลายจะมีไขมันเข้าไปแทนที่ นำไปสู่อาการตับอักเสบ และนำไปสู่ "ตับแข็ง"

ระบบอื่น ๆ ของร่างกาย

- เสี่ยงความเสี่ยง ต่อการเกิด
- โรคความดันโลหิตสูง
- โรคหัวใจในเอื้อลสูง
- โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายหรือเส้นเลือดในสมองอุดตัน
- ภัยถึงเอ็ดด้า เม็ดเลือดขาวต่ำ เม็ดเลือดแดงต่ำ และโรคไม่แพ้ความ
- เสี่ยงความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน
- อวัยวะต่างๆ เรืองเรื้อรัง จึงทำให้

ช่องปากและลำคอ


• เกิดอาการระคายเคืองในช่องปากและลำคอ อย่างที่เรียกกันว่า "คอแห้งคอก"

หัวใจ

• หัวใจจะถูกกระตุ้นให้สูบฉีดโลหิตเร็วขึ้น ทำความหนักขึ้น เกิดโรคหัวใจโต มีอาการ หัวใจวายหรือหัวใจล้มเหลวตามมาในที่สุด

กระเพาะอาหาร

• โรคที่พบบ่อยในคนดื่มคือ กระเพาะอักเสบเรื้อรังพบ เมื่อดื่มจัดติดต่อกันเป็นเวลานานจะทำให้เป็นโรคออก ในกระเพาะอาหาร อาจเขียนเป็นลิต้า อูจจาระต่ำ



เซลล์

• เซลล์ทุกเซลล์จะทำงานเร็วขึ้นกว่าปกติจนเกินความจำเป็น ทำให้การทำงานของอวัยวะเปลี่ยนแปลง ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ จึงกลดการทำงานของเซลล์ และทำลายเซลล์ไปในที่สุด

